



## **PRZECIWWSKAZANIA DO ZABIEGU STYMULATORAMI:**

- Ciąża, karmienie piersi,
- Podwyższona temperatura i przeziębienie w dniu zabiegu,
- Zaburzenia krzepliwości,
- Nadmierne zwiotczenie tkanek,
- Cienka, wiotka skóra,
- Choroby autoimmunologiczne,
- Alergia na leki znieczulające,
- Nadwrażliwość na składnik toksyny botulinowej,
- Dermatologiczne zmiany skórne w obszarze poddawany zabiegowi (trądzik ropowniczy, stany ropne, alergiczne lub grzybicze, naczyniaki, liszaje, brodawczaki, przerwania ciągłości naskórka, poparzenia słoneczne),
- Zaburzenia przewodnictwa nerwowo-mięśniowego (miastenia gravis, zespół Lamberta Eatona, neuropatia obwodowa);
- Łuszczyca w fazie aktywnej,
- Nieustabilizowana cukrzyca,
- Hemofilia,
- Choroba nowotworowa,
- Żółtaczką i HIV,
- Arytmia serca,
- Epilepsja,
- Bielactwo,
- Opryszczka,

- Nadpobudliwość nerwowa, tiki nerwowe,
- Skóra z tendencją do koloidów i blizn,
- Sterydoterapia,
- Antybiotykoterapia,
- Stosowanie leków rozrzedzających krew,
- Stosowanie leków w ciągu ostatnich 2 tygodni: aminoglikozydy, aminochinoliny, D-penicylaminy, cyklosporyna, sukcyntylocholiny, turbokuraryna, tetracyklina, pankuronium, galamina, antagoniści kanałów wapniowych, linkomycyna, polimyksyna,
- Stosowanie leków zawierających kwas acetylosalicylowy (np. Alka Seltzer, Aspirin, Bufferin, Vivin itd.) w ciągu ostatniego tygodnia,
- Stosowanie leków do aplikacji miejscowej w obszarze objętym zabiegiem,
- Przeprowadzony zabieg złuszczenia naskórka w ciągu ostatnich 3 tygodni przed zabiegiem,
- Spożywanie alkoholu i środków odurzających w ostatnich 24 godzinach,
- Palenie papierosów zmniejsza efektywność zabiegu,
- Przeprowadzony zabieg chirurgii jednodniowej w ciągu ostatnich 12 miesięcy (przeciwwskazanie względne – do konsultacji),
- Pobyt w szpitalu w ciągu ostatnich 24 miesięcy (przeciwwskazanie względne – do konsultacji),
- Korzystanie z zabiegów z przerywaną ciągłością skóry w ciągu ostatnich 12 miesięcy (przeciwwskazanie względne – do konsultacji),
- Leczenie stomatologiczne (przeciwwskazanie względne – do konsultacji),
- Korzystanie z usług fryzjerskich (przeciwwskazanie względne – do konsultacji),
- Wszelkiego rodzaju szczepienia (nie mniej niż 1 tydzień przed zabiegiem).